

5 สารพิษ อันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า



1. นิโคติน

ทำให้เซลล์สมองอักเสบ
ยิ่งในคนอายุต่ำกว่า 25 ปี
กระทบต่อการพัฒนาการของสมอง



2. ฟอร์มัลดีไฮด์

ทำร้ายเยื่อบุทางเดินหายใจ
และเซลล์เยื่อทั่วร่างกาย
เสี่ยงเกิดมะเร็งหากได้รับต่อเนื่อง



3. โพรโพลีนไกลคอล

ทำลายชั้นของเลนส์บนผิวดวงตา
ทำให้จอประสาทตาเสื่อม



4. กลีเซอรอล

เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
ทำให้วิงเวียน คลื่นไส้



5. สารหนู

หากได้รับปริมาณมาก ส่งผลต่อ
การแข็งตัวของเลือดเสี่ยงภาวะ
เลือดไหลไม่หยุด

สสส. และภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย
รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

กฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้า

THE
STANDARD

- **สูบบุหรี่ไฟฟ้า**
ในพื้นที่สาธารณะ/เขตปลอดบุหรี่
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

- **ผู้นำเข้า**
จำคุกไม่เกิน 10 ปี
ปรับ 5 เท่าของมูลค่าสินค้า
หรือทั้งจำทั้งปรับ

- **ผู้ขาย-ผู้ให้บริการ**
จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

- **ผู้ครอบครอง**
จำคุกไม่เกิน 5 ปี
ปรับ 4 เท่าของมูลค่าสินค้า
หรือทั้งจำทั้งปรับ

THESTANDARD.CO